

Přisátí klíštěte

Klíště v různých stadiích vývoje saje krev, může přenést boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu.

První pomoc:

Odstranit klíště z kůže co nejdříve. Ranku před manipulací s klíštětem vydezinfikujeme.

Klíště uchopíme za pomoci pinzety co nejbližší kůži a jemně vikláme ze strany na stranu. Po vytažení následuje druhá dezinfekce rány (Jodisol). Nepoužívej olej ani mast. Klíště nemačkej ani po vytažení, může být infekční. Kontrola kůže za 2 dny a pátrání po známkách infekce.

Literatura

1. ATKINS, Dianne L., et al. Part 11: Pediatric Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality. *Circulation*, 2015, 132.18 suppl 2: S519–S525.
2. BERNATOVÁ, E.: Příručka první pomoci, ISBN 978-80-204-3396-1. Mladá fronta, 2014.
3. KLEINMAN, Monica E., et al. Part 5: Adult basic life support and cardiopulmonary resuscitation quality. *Circulation*, 2015, 132.18 suppl 2: S414-S435.
4. KLEMENTA, B. KLEMENTOVÁ, O, MARCIÁN P. Resuscitace: 2. rozšířené vydání.
5. MACONCHIE, Ian K., et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. *Resuscitation*, 2015, 95: 223–248.
6. PERKINS, Gavin D., et al. European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015. *Resuscitation*, 2015, 95: 81–99.
7. ROZKYDAL Z., KOCOURKOVÁ P., Zdravotnická první pomoc, MU, Brno, 2011. ISBN 978-80-87192-17-7
8. SAIBERTOVÁ, S.: První pomoc, Skripta Lékařská fakulta, MU, Brno, 2014.
9. SOAR, Jasmeet, et al. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015. *Resuscitation*, 2015, 95: 100–147.

Další zdroje:

www.akutne.cz

<http://www.ces-hep.cz/file/328/doporuceny-postup-chs-amanita-phalloides.pdf>

<http://www.solen.cz/pdfs/med/2009/04/12.pdf>