

Farmakon Press, spol. s r.o.
Václavská 12
120 00 Praha 2
tel.: 211 152 606
fax: 227 077 295

šéfredaktor
zástupkyně
šéfredaktora
obchodní ředitelka

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Mgr. Kateřina Daňhová
Bc. Petra Hakavcová

redakční rada

MUDr. David Doležil, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D., FESC, FACC
MUDr. Stanislav Konštický, CSc.
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
MUDr. Radek Litvik
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc.
MUDr. Libor Zámečník

odborná redakce

Mgr. Kateřina Daňhová
danhova@farmakoterapie.cz
MUDr. Jana Fabiánová
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

jazyková redakce
marketing
a inzerce

Mgr. Eva Kolenčíková
Bc. Petra Hakavcová
mobil: 602 283 088
hakavcova@farmakoterapie.cz
Jakub Štěpánovský
stepanovsky@farmakoterapie.cz
mobil: 602 575 905

grafická úprava

Věra Horáčková
verkahor@farmakoterapie.cz
Helena Mešková

obálka
tisk

Profimedia
Logik, s.r.o.

internetové stránky
ročník 11

Allstar Group
září 2015

cena jednoho čísla

80 Kč, v rámci zvýhodněného
předplatného 60 Kč

předplatné

SEND Předplatné, spol. s r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425,
SMS: 777 333 370
send@send.cz, www.send.cz.

e-mail

registrace

ISSN


MK ČR E 15849
1801-1209

copyright

pokyny pro autory

© 2015 Farmakon Press, spol. s r.o.
naleznete na www.farmakoterapie.cz

Články publikované v tomto časopise reprezentují názor autora
či autorů. Jakákoli část obsahu časopisu nesmí být kopírována
nebo rozmnožována s cílem dalšího rozšiřování jakýmkoli způsobem
a v jakékoli formě bez souhlasu Farmakon Press, spol. s r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a reklamy.




kazuistiky/klinická praxe |

- 394** Vildagliptin v léčbě diabetes mellitus 2. typu (K. Urbančová)
- 397** Zkušenost s léčbou fixní kombinací perindopril arginin/indapamid/amlodipin v ordinaci interního lékaře (J. Šmakalová)
- 400** Zkušenosti s léčbou linagliptinem (M. Szabó)
- 428** Lixisenatid jako „stále“ moderní antidiabetikum s dlouhotrvajícím účinkem (M. Pelikánová)
- 430** Případ zapeklité hypertenze (J. Brotánek)
- 434** Klinické zkušenosti s canagliflozinem (J. Olšovský)
- 437** Pirfenidon v léčbě idiopatické plicní fibrózy (R. Bittenglová, Z. Chudáček)

zprávy z kongresů |

- 402** Významná role IL-6 v kloubních i mimokloubních projevech revmatoidní artritidy
- 408** Diagnosis and Treatment of Atypical Haemolytic Uremic Syndrome in Paediatric Patients – Report from Central and Eastern European Roundtable Meeting



nová léčiva/nové indikace


- 442 Adalimumab v léčbě psoriázy u dětí a dospívajících (*S. Polášková*)
- 448 Fixní kombinace empagliflozinu a metforminu v léčbě diabetu 2. typu (*J. Škrha*)
- 452 Flutikason furoát/vilanterol trifenatát – nová fixní kombinace v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (*V. Kašák*)
- 459 Fixní kombinace inzulinu degludec/liraglutid v léčbě diabetes mellitus 2. typu (*M. Haluzík*)

profily léčiv

- 468 Stroncium ranelát – důležitá alternativa v léčbě osteoporózy (*J. Jenšovský*)
- 474 Inzulin glargin 300 jednotek/ml (*M. Haluzík*)
- 492 Nová duální kombinace aklidiniumu bromidu a formoterolu v léčbě nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (*M. Mareš*)


farmakoterapeutické postupy

- 518 Současné možnosti léčby dyslipidemie u pacientů s kardiometabolickým syndromem (*H. Rosolová*)
- 523 Trimetazidin z pohledu klinické praxe (*J. Hradec*)
- 528 Optimalizovaná strategie léčby hypertenze (*A. Linhart*)
- 532 Možnosti dlouhodobé lokální léčby atopické dermatitidy (*R. Litvík*)
- 539 Farmakologické vlastnosti nové fixní kombinace aklidiniumu bromidu s formoterolem fumarátem (*J. Slíva*)



klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 417 Dlouhodobá populační studie ukázala vysokou perzistenci k injekční léčbě roztroušené sklerózy
- 418 Komentář ke studii (*R. Ampapa*)
- 421 Podíl pacientů s nežádoucími účinky léčby roztroušené sklerózy je nižší při injekční léčbě glatiramer acetátem než při perorální léčbě dimethyl fumarátem a teriflunomidem
- 422 Komentář ke studii (*R. Ampapa*)
- 423 Vliv sitagliptinu na kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
- 424 Komentář ke studii (*M. Kvapil*)
- 426 Tiotropium v léčbě průduškového astmatu dospělých (*N. Pauk*)
- 464 Úspěšnost léčby liraglutidem – výsledky post hoc analýzy studie EVIDENCE
- 466 Nákladová efektivita sevelameru v porovnání s kalcium karbonátem u pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez nutnosti dialýzy – analýza studie INDEPENDENT
- 480 Nová paradigmata v léčbě CHOPN: Jak mohou výsledky studie LANTERN ovlivnit pohled na léčbu CHOPN? (*J. Zatloukal*)
- 485 Účinnost a bezpečnost fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v porovnání s volnou kombinací tiotropia a formoterolu u pacientů s CHOPN – studie QUANTIFY
- 486 Porovnání účinnosti a bezpečnosti lixisenatidu podávaného 1x denně v kombinaci s inzulinem glargin vs. režimy Bazal Plus a Bazal Bolus s inzulinem glulisin
- 488 Studie ODYSSEY LONG TERM (*P. Janský*)
- 491 Kardiovaskulární bezpečnost lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ELIXA



klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 504** Bezpečnost a účinnost evolocumabu ke snížení hladin aterogenních lipidů a výskytu kardiovaskulárních příhod
- 506** Komentář ke studii (*M. Vrablík*)
- 508** Účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – studie INPULSIS-1 a INPULSIS-2
- 511** Účinnost a bezpečnost canagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
- 513** Účinek roflumilastu na výskyt exacerbací u pacientů s těžkou CHOPN léčených inhalačními kortikosteroidy a LABA – studie REACT
- 514** Komentář ke studii (*V. Bártů*)
- 517** Účinnost dapagliflozinu přidaného ke kombinaci saxagliptin + metformin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky otevřené fáze studie NCT01646320
- 543** Kombinace biologické léčby s jinými systémovými léčebnými postupy při psoriáze – doporučení Medical Board of the National Psoriasis Foundation (*P. Cetková*)
- 547** Riziko hospitalizace pro srdeční selhání při léčbě inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 vs. deriváty sulfonylurey a při terapii saxagliptinem vs. sitagliptinem v podmínkách běžné klinické praxe



zprávy z klinických studií |

- 425 Beraprost v prevenci endotoxinem vyvolaného poškození plic
- 458 Kyselina ursodeoxycholová v léčbě biliární cirhózy
- 463 Příznivý vliv inhibice MEK1/2 na aterosklerotické léze
- 467 Albiglutid: nový agonista GLP-1
- 473 Lumacaftor-ivacaftor u nemocných s cystickou fibrózou
- 473 Suplementace vitamínem D u nemocných s tuberkulózou
- 479 Sójové izoflavony v léčbě astmatu?
- 479 Optimální trvání antituberkulózní léčby u diabetiků
- 503 Ovlivnění tělesné hmotnosti liraglutidem
- 507 Daclatasvir plus sofosbuvir v léčbě hepatitidy C
- 507 Úloha prostaglandinů při respiračním onemocnění exacerbovaném kyselinou acetylsalicylovou
- 512 Kyselina arachidonová jako léčivo
- 516 Statiny oddalují zahájení léčby inzulinem u diabetiků
- 527 Kyselina obeticholová u biliární cirhózy
- 527 Metformin a salicylát v léčbě steatohepatitidy
- 538 Modifikace kardiovaskulárního rizika u diabetiků 2. typu léčených gliptiny
- 542 Působení eculizumabu u atypického hemolyticko-uremického syndromu
- 542 Ezetimib v léčbě nealkoholické steatohepatitidy: studie MOZART
- 546 Dulaglutid vs. glargin – výsledky studie AWARD-4
- 546 Daclatasvir, asunaprevir a beclabuvir u osob bez cirhózy jater infikovaných virem hepatitidy C