



copyright © 2015 Farmakoterapie, spol. s r.o.

zprávy z kongresů |

- 713** Kardiovaskulární paměť antihypertenzní léčby
- 719** Jít správnou cestou...
- 726** Současné a potenciální využití plerixaforu, inhibitoru CXCR4/SDF1 α
– setkání odborníků
- 732** Česko-slovenská lipidová akademie – zpráva z kongresu

kazuistiky/klinická praxe |

- 740** Abatacept v léčbě revmatoidní artritidy (*D. Suchý*)
- 742** Aflibercept u pacientky s metastatickým kolorektálním karcinomem
(*S. Batko*)
- 747** Zkušenosti se systémovou léčbou psoriázy (*J. Urbánek*)



nová léčiva/nové indikace

- 749 Vortioxetin – nové antidepresivum (*K. Látalová*)

nové trendy ve farmakoterapii

- 754 Trimetazidin – nový pohled na jeho kardioprotektivní účinek
(*M. Krutský, M. Vrána*)

farmakoterapeutické postupy

- 768 Novinky v biologické léčbě psoriatické artritidy
(*H. Ciferská, L. Šedová, J. Štolfa*)
- 776 Golimumab v léčbě ankylozující spondylitidy (*Š. Forejtová*)
- 782 Tikagrelor jako posun ve skupině protideštičkových léků – farmakologické vlastnosti, klinická účinnost a nežádoucí účinky (*O. Mayer*)
- 789 Dlouhodobé zkušenosti s léčbou revmatoidní artritidy tocilizumabem
(*H. Mann*)
- 793 Bosentan a léčba digitálních ulcerací (*R. Bečvář*)
- 797 Farmakologický pohled na postavení SYSADOA v léčbě osteoartrózy
(*J. Slíva*)




copyright © 2015 Farmakon Press, spol. s r.o.

farmakoekonomika

- 835 Analýza nákladové efektivity na základě analýzy přežívání na léčbě u jednotlivých terapií v indikaci revmatoidní artritidy (*T. Mlčoch, T. Doležal*)

klinické studie, klinické studie s komentářem

- 762 Vliv předchozí biologické léčby na terapeutickou odpověď u pacientů s revmatoidní artritidou léčených adalimumabem
- 765 Vliv trazodonu na dopaminergní a noradrenergní systém
- 766 Komentář ke studii (*E. Češková*)
- 801 Nepřímé porovnání mezi podkožně podávanými biologickými látkami v léčbě ankylozující spondylitidy
- 802 Predikce dlouhodobé odpovědi na antidepresivní léčbu podle smutku a radosti (*S. Racková*)
- 805 Vliv výchozích koncentrací anti-CCP2 na účinnost léčby abataceptem a adalimumabem – analýza studie AMPLE
- 806 Komentář ke studii (*D. Suchý*)
- 809 Dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a C-reaktivního proteinu pomocí kombinace ezetimibu a simvastatinu je spojeno s lepšími výsledky – analýza studie IMPROVE-IT
- 810 Komentář k nové analýze studie IMPROVE-IT o dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a hs-CRP (*H. Rosolová*)
- 813 Dvouleté zhodnocení rentgenových a klinických výsledků u pacientů s revmatoidní artritidou ve studii CAMEO (Kanadská studie s etanerceptem a metotrexátem) (*Z. Fojtík*)



copyright © 2015 Farmakoterapie, spol. s r.o.

klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 816** Klinická využitelnost koncentrací anti-TNF a měření protilátek pro předpověď dlouhodobé léčebné odpovědi u pacientů s revmatoidní artritidou
- 818** Cabazitaxel a abirateron acetát po selhání docetaxelu v léčbě pacientů s metastazujícím kastročně rezistentním karcinomem prostaty
- 821** Komentář ke studii (*J. Dvořák*)
- 823** Secukinumab v porovnání s ustekinumabem u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie CLEAR
- 824** Komentář ke studii (*J. Ettlér*)
- 827** Fixní kombinace fenofibrát/simvastatin zlepšuje lipidový profil
- 828** Komentář ke studii (*J. Píthá*)
- 830** Apremilast v léčbě pacientů s psoriatickou artritidou – studie PALACE 1
- 831** Komentář ke studii (*J. Štolfa*)
- 839** Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky v prevenci relapsu u pacientů s recentně diagnostikovanou schizofrenií – studie PROSIPAL



copyright © 2015 Farmakoterapie, s.r.o.

zprávy z klinických studií |

- 753 Adherence k léčbě u nemocných po prodělaném infarktu myokardu
- 753 Klesající hladina estrogenerů zvyšuje riziko deprese
- 761 Venlafaxin versus venlafaxin plus fototerapie v léčbě těžké deprese
- 764 Vliv amitriptylinu a escitalopramu na funkční dyspepsii
- 767 Bococizumab v léčbě hypercholesterolemie
- 767 Eltoprazin mírní levodopou navozené dyskineze
- 775 Lurasidon v léčbě bipolární deprese
- 775 Změna dávky mirtazapinu ovlivňuje míru odpovědi u osob s depresí
- 796 Citalopram plus methylphenidat v léčbě deprese u seniorů
- 804 Nová možnost potenciace účinku inhibitorů proteasomu
- 812 Nespavost jako prediktor účinnosti antidepresiv
- 817 Desvenlafaxin v léčbě velké depresivní poruchy
- 822 Dlouhodobé účinky oxandrolonu u dívek s Turnerovým syndromem
- 829 Antidepresivní vlastnosti rozchodnice
- 833 Crocin: hlavní účinná látka šafránu