

- 314 Editorial (*K. Pavelka*)
- 318 Multioborový pohled na pacienta s revmatickým onemocněním
- 323 Sekukinumab v léčbě palmoplantární psoriázy indukované inhibitory TNF u pacientů s ankylozující spondylitidou (*M. Tošovský*)
- 328 Aktuální přístupy k léčbě obrovskobuněčné arteriitidy (*R. Bečvář*)
- 333 Nové indikace léčby anakinrou (*P. Doležalová*)
- 338 Účinnost a bezpečnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou (*D. Suchý*)
- 343 Novinky v léčbě psoriatické artritidy (*M. Olejárová*)
- 348 Adherence k léčbě subkutánně podávanými inhibitory TNF a hodnocení dávkového intervalu u pacientů se zánětlivou artritidou: analýza kanadské databáze
- 351 Komentář ke studii (*L. Šenolt*)
- 353 Dlouhodobé setrvání na léčbě anakinrou u Stillovy nemoci dospělých a prediktivní faktory léčebné odpovědi
- 356 Komentář ke studii (*P. Horák, M. Skácelová*)
- 358 Riziko žilního tromboembolismu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tofacitinibem vs. inhibitory TNF- $\alpha$
- 360 Dlouhodobá bezpečnost léčby revmatoidní artritidy tofacitinibem (9,5 roku) – souhrnná analýza studií zahrnutých do klinického programu vývoje
- 362 Vliv etanerceptu na strukturální změny na sakroiliakálních kloubech na MR u pacientů s non-radiografickou axiální spondyloartritidou – analýza studie EMBARK

## zprávy z kongresů |

- 364 Opdivo: současné léčebné možnosti a výzvy
- 369 Strategická pozice 3. linie mCRC v rámci léčebného kontinua pro celkové přežití pacientů

## kazuistiky/klinická praxe |

- 374 Pseudoprogrese imitující kostní metastázu u pacienta léčeného nivolumabem pro metastazující melanom  
(I. Krajsová, J. Jahoda, M. Syrůček, R. Kučera)
- 378 Olaparib v léčbě recidivujícího karcinomu ovaria (A. Germanová)
- 381 Přežití pacientů v závislosti na skóre MSKCC při léčbě sunitinibem v 1. linii léčby mRCC (J. Fínek, et al.)

### Minitéma čísla:

## Léčba hepatocelulárního karcinomu |

- 384 Screening hepatocelulárního karcinomu a kvalita surveillance v reálné praxi  
(K. Kubičková, P. Hříbek, M. Koula, et al.)
- 390 Porovnání výsledků léčby HCC sorafenibem ve studii SHARP a v klinické praxi (E. Kubala, L. Žitňanská, K. Kubičková, et al.)
- 393 Využití 2. linie systémové léčby u pacienta s hepatocelulárním karcinodem  
(Z. Donátová)

## nová léčiva/nové indikace |

- 397 Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie (L. Červinek)



## farmakoterapeutické postupy |

- 404 Zhodnocení výsledků léčby bazálními inzulinami druhé generace na podkladě dat získaných ze studií z reálné klinické praxe (*P. Žák*)
- 408 Léčba mozkových metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic (*L. Havel*)

## farmaceutická medicína |

- 460 Adalimumab a infliximab – porovnání originálních a biosimilárních léků pomocí vícerozměrné analýzy dat  
(*D. Vetchý, S. Pavloková, M. Vetchá, E. Dokoupilová*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 418 Účinnost a bezpečnost risankizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – výsledky studií UltIMMa-1 a UltIMMa-2
- 421 Komentář ke studii (*S. Gkalpakiotis*)
- 422 Doporučení Evropské federace pro bolesti hlavy týkající se použití monoklonálních protilátek cílících na CGRP nebo jeho receptor v prevenci migrény
- 427 Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s pokročilým NSCLC léčených po progresi
- 430 Komentář ke studii (*L. Havel*)
- 431 Druhá linie léčby u pacientů s mCRPC v reálné klinické praxi – chemoterapie vs. ARTA po progresi na ARTA v 1. linii léčby
- 435 Komentář ke studii (*J. Katolická*)
- 437 FOLFIRI-3 + aflibercept u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
- 438 Komentář ke studii (*Z. Linke*)



