

Tuto louku, která nejeví žádných stop kultury a byla ještě dobrě zachována, zvolil jsem za objekt zvláště vhodný pro vyzkoušení různých metod pro prozkum lučních porostů. Metoda sčítací, o kterou jsem se nejprve pokusil, byla v největší části louky zcela nemožná a to jak při sčítání ve čtverečním metru, rozdeleném na čtvereční decimetry, tak při sčítání posekaného porostu. V prvním případě nebylo možno mnohé druhy vůbec sčítati, poněvadž příslušnost lodyh, resp. stébel k jednomu individuu nebyla zřetelná. Při posekaní určité plošky bylo možno počítati nikoliv individua, nýbrž stébla (resp. innovace) nebo lodyhy. Nehledě k tomu, že nastala tím podstatná nerovnoměrnost, poněvadž byly sečítány jako rovnocenné jednotky jednak celá individua (tak u pcháče bahenního, atd.), jednak jen části individuí (tak u ostřice srstnaté a jiných), bylo sčítání znemožněno tím, že některé, zvláště sterilní druhy, tak na př. kostřava ovčí, rozpadly se v části, které se ke sčítání naprostě nechodily. Mimo to tato nepatrná, jen 60 kroků dlouhá a více jak dvakrátě užší louka vykazovala takové variace ve svém porostu, že bylo by nutno při nejmenším zpracování celou třetinu její plochy, kterýžto úkol mohl by být proveden sotva za celotýdenní plné práce a ovšem s předchozím svolením majitele, jenž by použitím této metody přišel téměř o všechno seno.

Louka ta je přirozená, třebas ne původní, poněvadž v dávnych dobách byla celá enklava Račínská (s vyloučením mokrých luk bažinných a mechatých) lesnatá a teprve po umělém odlesnění vytvořila se časem tato louka, zajisté bez jakéhokoliv zasáhnutí ruky lidské a její porost se konečně uvedl v jakousi rovnováhu, vyjádřenou dnešním porostem. Louka není vůbec opásána, pouze její nejsevernější cíp a malý pruh při východním okraji jeví nepatrné stopy bývalého opásání a souvisejícího s tím pohnovení, které se projevuje zejména hojným výskytem druhu *Leontodon hispidus*.

Poněvadž metoda sčítací naprostě selhala, resp. ukázala se neprověditelnou, zjistil jsem jednotlivé typy porostu a pak stanivil odhadem jejich složení, které jsem vyjádřil čísly 1—5, při čemž číslo 5 znamená nejvyšší stupeň abundance, číslo 1 pak nejnižší; druhy zcela ojedinělé v tom kterém typu označil jsem (1). S hlediska oekologického byly velmi pozoruhodné různé formy téhož druhu, vyskytajícího se v rozmanitých typech. Tak na př. tvořila kostřava červená formy přestatné, až přes $1\frac{1}{2}$ m vysoké a širokolisté, formy střední, 5—7 dm vysoké a konečně nízké, 3—4 dm vysoké, úzkolisté formy xerofilní, které připomínaly spíše kostřavu ovčí. Také množství druhů jiných vyjadřovalo svou oekologickou formou speciální podmínky toho kterého typu.

Hlavní typy byly tyto (viz připojený náčrtkek):

1. **Danthonietum**, jako typ suchomilný, nízký, při čemž vůdčí druh tvořil střední patro (mochna nátržník a jiné spodní), kdežto vyšší patro bylo representováno volně roztroušenou, ovšem v celku hojnou kostřavou červenou. Složení v hrubých rysech bylo toto:

Trojzubec vystoupavý (*Danthonia decumbens*) 5!

Obsah.

| | Str. |
|---|------|
| <i>Předmluva</i> | 1 |
| <i>Díl první:</i> | |
| Základy rostlinné sociologie. | |
| I. Pojem rostlinné sociologie | 9 |
| II. Stanoviště, útvary (formace) a sdružení (asociace) rostlinná jako základní pojmy sociologie | 12 |
| 1. Všeobecná definice | 12 |
| 2. Stanoviště, sdružení a útvary v pojetí různých autorů | 16 |
| 1. Stanoviště a jeho souvislost s porostem | 17 |
| 2. Asociace jako základní jednotka sociologická | 22 |
| 3. Poměr útvaru rostlinného k sdružení | 28 |
| III. Klasifikace útvarů rostlinných | 32 |
| 1. Dominovo členění útvarů české květeny | 32 |
| 2. Drudeovo třídění společenstev rostlinných (1905) | 38 |
| 3. Dieľsova klasifikace útvarů rostlinných (1908, 1910) | 39 |
| 4. Brockmann-Jeroschova a Rübelova klasifikace útvarů rostlinných (1912) | 40 |
| 5. Warming-Graebnerovy typy útvarové (1918) | 43 |
| 6. Soustava Gust. Einara Du Rietza (1921) | 49 |
| 7. Rübelův systém z r. 1922 | 52 |
| 8. Braun-Blanquetův pokus o uspořádání společenstev rostlinných na základě jejich sociologické progrese | 52 |
| 9. Pojmenování společenstev rostlinných | 54 |
| a) Terminologie národní | 55 |
| b) Terminologie latinská | 55 |
| IV. Životní či růstové tvary rostlin | 62 |
| 1. Část všeobecná | 62 |
| 2. Soustavy životních či růstových tvarů | 65 |
| 3. Soustava Raunkiärova | 67 |
| 4. Systém Warming-Graebnerův (1918) | 74 |
| 5. Soustava základních tvarů podle G. Einara Du Rietza (1921) | 78 |
| 6. Závěrečné poznámky | 79 |
| V. Sociologické rozborové společenstev rostlinných | 82 |
| 1. Všeobecné zásady pro popisy a rozborové asociaci | 82 |

| | Str. |
|--|------------|
| 2. Metody pro zjišťování abundance v asociačních porostech | 86 |
| A. Metody odhadovací | 86 |
| B. Metoda váhová | 89 |
| C. Metody sčítací | 90 |
| a) Metoda Clementsova | 92 |
| b) Raunkiärova metoda valenční | 93 |
| c) Lagerbergova sčítací metoda | 94 |
| d) Metoda upsalské sociologické školy | 95 |
| e) Gleasonova modifikace kvadrátové metody | 95 |
| f) Můj systém čtvercového měření | 96 |
| g) Kritické posouzení metod sčítacích | 97 |
| D. Metody liniové | 100 |
| 3. Kombinovaný odhad početnosti a pokryvnosti | 103 |
| 4. Pokryvnost (dominance) | 104 |
| 5. Hustota či densita druhů | 107 |
| 6. Pravidla stálosti a minimi-areál sdružení rostlinných | 113 |
| a) Úvahy všeobecné | 113 |
| b) Stanovení konstante a minimi-areálu | 115 |
| c) Konstanty švýcarské školy sociologické | 120 |
| d) Asociační konstanty ve větších a menších územích | 122 |
| e) Schustlerovo pojímání konstante druhů | 124 |
| 7. Příklad analýzy sdružení na stálost (konstanci) a abundance provedené švýcarskou školou | 125 |
| 8. Některé zvláštní metody pro analýzy společenstev rostlinných | 125 |
| a) Hultova analytická metoda | 125 |
| b) Paul Jaccardova metoda | 129 |
| c) Schustlerova metoda pro zjišťování lokální konstante a minimi-areálu | 130 |
| d) Některé modifikace čtvercových metod | 131 |
| 9. Vzorný snímek asociace provedený švýcarskou školou | 132 |
| 10. Dynamická hodnota druhů | 134 |
| 11. Soudružnost (sociabilita) a rozložení (repartice) druhů v asociačních porostech | 135 |
| 12. Věrnost druhů | 137 |
| 13. Životní síla a propagační schopnost druhů | 142 |
| 14. Periodicitu druhů | 143 |
| 15. Pásmoveé členění vegetace | 143 |
| 16. Rozvrstvení druhů v patra (stratifikace vegetace) | 144 |
| 17. Kartografické znázornění společenstev rostlinných | 147 |
| VI. Soused (sukcese) společenstev rostlinných a společenstva závěrečná (klimaxová) | 157 |
| 1. Rovnováha společenstev rostlinných | 157 |
| 2. H. C. Cowles jako zakladatel moderní nauky sukcesionistické | 160 |
| 3. F. E. Clements a jeho škola | 161 |
| 4. Švýcarská škola sukcesionistů | 166 |
| 5. Jini sukcesionisté | 171 |

| | Str. |
|---|------------------------|
| 6. Různé typy sukcese | 172 |
| 7. Začáteční, přechodná a závěrečná společenstva | 173 |
| 8. Spěje vývoj vegetace k malému počtu klimatických závěrečných útvarů? | 179 |
| 9. Metody pro snímky sukcesi společenstev rostlinných | 182 |
| Díl druhý: | |
| Použití metod sociologických pro výzkum lučních a pastvinných porostů. | |
| A. Část všeobecná | 187 |
| 1. V čem spočívá prozkum lučních porostů a které otázky nutno řešit? | 187 |
| 2. Floristické, oekologické a sociologické předpoklady pro rozbory lučních společenstev a obtíže s analysou spojené | 189 |
| 3. Brockmann-Jeroschovo a Rübelovo třídění lučních útvarů | 199 |
| 4. Oekologie trav a lučních rostlin vůbec | 204 |
| 5. Kulturní louky, bonita luk a variace pícních rostlin | 211 |
| 6. C. A. Weberovy výzkumy lučních a pastvinných porostů Německa | 220 |
| 7. Analytické metody váhové a dvě metody Weinzierlové | 227 |
| 8. Klappovy studie a rozbory hornobavorských lučních porostů | 236 |
| B. Část speciální | 245 |
| Rozbory lučních porostů Českomoravské vysočiny různými metodami sociologickými. | |
| 1. Všeobecné poznámky o vegetačních poměrech Žďárských hor a přilehlých krajů | 246 |
| 2. Nardeta v Českomoravské vysočině | 251 |
| a) Všeobecné poznámky | 251 |
| b) Nardetum č. X. | 1. příloha za str. 252 |
| c) Snímek č. I.—XX. | 2. příloha za str. 252 |
| d) Poznámky o porostu a o stanovišti (č. I.—XX.) | 252 |
| e) Zákony konstance smilkových porostů | 260 |
| f) Varianty Nardet a příbuzná společenstva v Českomoravské vysočině (snímek č. XXI. až XXVIII.) | 264 |
| g) Poznámky o porostu a stanovišti (č. XXI. až XXVIII.) | 264 |
| 3. Poznámky o smilkových porostech v jiných částech území československého a v Alpách | 272 |
| 4. Některé jiné luční porosty Českomoravské vysočiny | 283 |
| A. Xerofilní a subxerofilní porosty luční | 284 |
| B. Louka v Račíně | 286 |
| C. Louka s mnoha lučními typy na sever od Račína | 288 |
| D. Kulturní louky | 296 |
| Výklad tabulek | 301 |
| Seznam literatury | 349 |
| Anglické resumé: Problems and Methods of Plant Sociology and their Application for the Analysis of Meadows and Pastures | 369 |